

STAPHYLINIDAE (COLEOPTERA): ATHETA FROM
THE AZORES AND MADEIRA¹

Compiled by Per Brinck²

Most Staphylinidae collected by the Lund University Expedition in the Azores and Madeira from February to April 1957 were dealt with by A. Smetana in Report No. 59 (Bol. Mus. Mun. Funchal XXV: 53-67, 1970). The present material has been identified by Dr. G. Benick, Lübeck (Germany).

Dr. Smetana pointed out that the staphylinid fauna of the Azores is poor. The majority of the species are widely distributed, several are cosmopolitan. The same applies to the material of *Atheta*, listed below.

Atheta sulcifrons Steph.

São Miguel. Caldeira das Sete Cidades. 21.3.57. Loc. 50. 1 ex. — 1 km N of Feteiras. 2.3.57. Loc. 5. 1 ex.

Flores. Central plateau, S and SE of Caldeira Comprida. 14.4.57. Loc. 109. 1 ex.

Madeira. Porto Novo, Rib. do Porto Novo. 22.4.57. Loc. 119. 1 ex. — Rib. Frio. 1000 m, 8 km SSW of Faial. 26.4.57. Loc. 128. 1 ex.

Distribution: Cosmopolitan.

Atheta insecta (Thoms.)

São Miguel. Valley of Ribeira Quente, 2 km SE of Furnas. 11.3.57. Loc. 23. 1 ex.

Madeira. Serra de Água. Powerstation. 600 m. 23.4.57. Loc. 120. 1 ex.

Distribution: Europe, North Africa, Asia Minor.

Atheta palustris Kiesw.

São Miguel. Lombo da Cruz, 3 km NW of Feteiras. 2.3.57. Loc. 6. 2 ex. — Sete Cidades, at Lagoa Verde. 2.3.57. Loc. 8. 1 ex. — Ponta Delgada. 3.57. Loc. 9. 1 ex. — Ponta Delgada, 2 km NE of town. 3.3.57. Without locality number. 2 ex. — Lagoa do Carvão. 7.3.57. Loc. 13. 1 ex. — Caldeira das Sete Cidades. 8.3.57. Loc. 18. 4 ex. — 2 km E of Ribeira Grande. 9.3.57. Loc. 19. 1 ex. — Ribeira da Praia, 3 km W of Vila Franca do Campo. 13.3.57. Loc. 27. 6 ex. —

¹Report No. 65 from the Lund University Expedition in 1957 to the Azores and Madeira.

²Ecology Building, University of Lund, S-223 62 Lund. Sweden.

Relva, tanque da Rocha Quebrada. 15.3.57. Loc. 31. Freshwater pond. 19 ex. — Tanque (pond) 1 km SE Lagoa do Congro. 16.3.57. Loc. 33. 5 ex. — Lagoa do Congro. 16.3.57. Loc. 34. 11 ex. — Ribeira Seca, W R. Grande. 18.3.57. Loc. 37. 61 ex. — At Lagos do Fogo. 22.3.57. Loc. 54. 1 ex. — River NW Água Retorta. 23.3.57. Loc. 57. 2 ex. — Lagoa das Furnas. 24.3.57. Loc. 58. 6 ex. — Furnas, hot springs. 24.3.57. Loc. 59. 1 ex. — 1 km N of Povoação, Ribeira dos Lagos. 24.3.57. Loc. 60. 6 ex. — Pico Verde. 24.3.57. 61. 5 ex. — 1,5 km S of Maia. 25.3.57. Loc. 62. 2 ex.

Santa Maria. 3 km NE Vila do Porto, Fonte do Monrato. 19.3.57. Loc. 38. 1 ex. — Praia. 20.3.57. Loc. 47. 1 ex.

Faial. Praia do Almoxarife. 31.3.57. Loc. 72. 1 ex. — 0,5 km WNW of Ribeirinha. 1.4.57. Loc. 73. 1 ex. — Ponto da Boca da Ribeira, 1 km E of Ribeirinha. 1.4.57. Loc. 74. 6 ex. — Baía da Areia das Fontes, 1 km N of Praia do Norte. 2.4.57. Loc. 77. 3 ex.

Madeira. Serra de Água. Powerstation. 600 m. 23.4.57. Loc. 120. 2 ex.

Distribution: Cosmopolitan.

Atheta amricula Steph.

São Miguel. Ponta Delgada. 3.3.57. Loc. 9. 2 ex. — 3 km E of Ribeirinha (N coast). 25.3.57. Loc. 63. 2 ex.

Faial: Praia do Almoxarife. 31.3.57. Loc. 72. 1 ex.

Distribution: Cosmopolitan.

Atheta oblita Ev.

São Miguel. Ribeira Seca, W R. Grande. 18.3.57. Loc. 37. 2 ex.

Distribution: Europe, Asia Minor.

Atheta coriaria Kr.

São Miguel. São Roque. 15.3.57. Loc. 30. 1 ex. — Relva, tanque da Rocha Quebrada. 15.3.57. Loc. 31. 1 ex.

Distribution: Cosmopolitan.

Atheta pertyi Heer

São Miguel. Ribeira Seca, W R. Grande. 18.3.57. Loc. 37. 3 ex. — 3 km E of Ribeirinha (N coast). 25.3.57. Loc. 63. 3 ex.

Santa Maria. Pico Alto. 590 m. 19.3.57. Loc. 40. 1 ex. — Pico Alto. 550 m. 19.3.57. Loc. 42. 1 ex.

Faial. 0,5 km WNW of Ribeirinha. 1.4.57. Loc. 73. 2 ex. — Baía da Areia das Fontes, 1 km N of Praia do Norte. 2.4.57. Loc. 77. 1 ex.

Distribution: Palaearctic region.

Atheta castanoptera Mannerh.

São Miguel. Tanque 1 km SE Lagoa do Congro. 16.3.57. Loc. 33. 1 ex. — 3 km E of Ribeirinha (N coast). 25.3.57. Loc. 63. 1 ex.

Faial. 0,5 km WNW of Ribeirinha. 1.4.57. Loc. 73. 1 ex.

Distribution: Europe, Caucasus.

Atheta atramentaria Gyll.

São Miguel. Ponta Delgada. 3.57. Loc. 9. 4 ex. — Ponta Delgada, 2 km NE of town. 5.3.57. Without locality number. 1 ex. — Ribeira Seca W R. Grande. 18.3.57. Loc. 37. 11 ex. — Ribeira das Três Voltas, near Ribeira Chã. 29.3.57. Without locality number. 1 ex. — Caldeira das Sete Cidades. 21.3.57. Loc. 50. 1 ex. — 1 km W of Ribeira Seca, W of Ribeira Grande. 22.3.57. Loc. 53. 11 ex. — 1 km N of Povoação, Ribeira dos Lagos. 24.3.57. Loc. 60. 1 ex. — 1,5 km S of Maia. 25.3.57. Loc. 62. 1 ex. — 3 km E of Ribeirinha (N coast). 25.3.57. Loc. 63. 1 ex.

Terceira. Lagoa do Ginjal. 27.3.57. Loc. 66. 1 ex.

Pico. Vole, W side ca. 350 m. 8.4.57. Loc. 99. 1 ex.

Faial. Praia do Almoxarife. 31.3.57. Loc. 72. 10 ex. — 0,5 km WNW of Ribeirinha. 1.4.57. Loc. 73. 4 ex. — Baía da Areia das Fontes, 1 km N of Praia do Norte. 2.4.57. Loc. 77. 14 ex. — 3 km WNW of Pedro Miguel. 5.4.57. Loc. 92. 1 ex. — Horta, Porto Pim. 7.4.57. Loc. 94. 1 ex.

Distribution: Palaearctic region, East Africa.

Atheta nigra Kr.

São Miguel. Ponta Delgada, 2 km NE of town. 3.3.57. Without locality number. 1 ex.

Distribution: Cosmopolitan.

Atheta zealandica Cam.

Synonym: *Atheta maderense* Likovsky.

São Miguel. 3 km E of Ribeirinha (N coast). 25.3.57. Loc. 63. 4 ex. — Ponta Delgada. 13.3.57. Loc. 9. 3 ex.

Distribution: New Zealand, Madeira, North Africa.

Nehemitropia sordida Marsh.

São Miguel. Ribeira da Praia, 3 km W of Vila Franca do Campo. 13.3.57. Loc. 27. 1 ex. — Caldeira das Sete Cidades. 21.3.57. Loc. 50. 1 ex. — 3 km S of Pico da Pedra. 25.3.57. Loc. 64. 2 ex.

Faial. Baía da Areia das Fontes, 1 km N of Praia do Norte. 2.4.57. Loc. 77. 2 ex.

Distribution: Europe, Caucasus, Palestine, Egypt.