

# PRÉSENCE DE DIPLURES PARAJAPYRIDÉS AUX AÇORES <sup>1</sup>

PAR JEAN PAGÈS <sup>2</sup>

## *Parajapyx (P.) isabellae* (Grassi)

Ile de Faial. Loc. 74: Porto da Boca da Ribeira, à 1 km à l'E de Ribeirinha, 1.IV.57, 1 ♀ au stade III, longue de 2,9 mm. Loc. 88: Costa da Náu, à 3 km au NW de Capêlo, 4.IV.57, 1 ♀ au stade III, longue de 3,0 mm.

Ce sont à ma connaissance les premiers *Japygoidea* capturés dans cet archipel. Les récoltes sont effectuées par la Mission Brinck — Dahl, Université de Lund (Suède).

*P. (P.) isabellae* est la seule espèce de cette superfamille qu'il soit possible de qualifier de cosmopolite. Vraisemblablement originaire du bassin méditerranéen dont elle colonise toutes les rives, elle est connue d'Asie, des îles du Pacifique et des deux Amériques.

Par rapport à ce que je considère comme la f. typ. (Pagès, 1952) les spécimens açoriens montrent dans les proportions des soies des organes subcoxaux et des cerques des différences qui, si elles se retrouvent chez de plus nombreux exemplaires de même provenance, permettront d'envisager la création d'une sous-espèce particulière caractérisée par:

1.°/ longueur des soies glandulaires égalant les 78-82/100 de celle du style 1 (aussi longue chez le type),

2.°/ longueur des soies sensorielles égalant les 98-102/100 de celle du style 1 (les 135/100 chez la f. typ.),

3.°/ largeur des cerques au niveau de la  $d_3$  égalant les 33/100 de la longueur de ces appendices (les 36-40/100 chez la f. typ.).

## LITTÉRATURE

- Pagès, J.,  
1952. Contribution à l'étude des *Japygidae* (*Insecta Entotrophi*) d'Algérie et de Tunisie. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 77, p. 125-148.

1) Report No. 45 from the Lund University Expedition in 1957 to the Azores and Madeira.

2) Laboratoire de Biologie Animale et Générale, Faculté des Sciences de DIJON.